

Københavns Universitet

Plastikkirurgi

Af Asma Bashir, stud med.

www.asmabashir.com

Basisbog i Medicin & Kirurgi Kapitel 18: Plastikkirurgi
Kirurgisk kompendium Kittelbog
Gamle eksamensopgaver
SLIDES fra forelæsningstimer og holdtimer

Plastikkirurgi:

Plastikkirurgi arbejder i alle kroppens forskellige væv. Det plastiske arbejdsfelt omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af medfødte og erhvervede deformiteter samt defekter opstået som følge af infektion, vævshenvalg, atrofi, hypertrofi, traume eller tidligere given behandling.

Det drejer sig om indgreb som:

- Korrektiv indgreb – til normalisering af deformiteter eller dysfunktioner
- Rekonstruktiv indgreb – genskabelse af manglende funktioner eller manglende strukturer

Incision:

Incision foretages med en skalpel, som fortrinsvis holdes i blyantsgreb, således at snittet placeres lodret ned gennem hudens lag. Incisioner lægges altid så vidt som muligt i hudens spalteretninger, hvorved det efterfølgende ar bliver mindst synligt.

Excision:

Kutane elementer kan excideres som følgende:

- Lancetformet
- Kantformet
- Cirkulært

Suturering:

Lukning af sår foregår ved suturering, perkutan eller intradermal, clips, tape eller lim. Den anvendte teknik spiller en rolle for den senere ardannelse. Målet er at der opnås et godt funktionelt resultat, og at ardannelsen bliver så upåfaldende som muligt.

Der må ikke være tension i huden, når sårkanterne lukkes, samt de skal placeres symmetrisk omkring suturlinjen. Det er ikke tilrådeligt at sy subcutis, idet suturer her ikke stabiliserer såret yderligere, men i stedet for resulterer i vævsnekroser. Er der behov for at aflaste såret i øvrigt, gøres dette med tape eller suturer i dermis med inverteret knudeplacering. Man skal undlade for stramme eller for grove suturer. Der skal i den knyttede suturløkke være plads til, at vævet kan opbygge et let ødem, uden at suturen strangulerer vævet.

Almindeligvis anvendes dimension 4-0. Til ryggen eller underekstremiteterne anvendes 3-0, og i ansigtet anvendes 5-0 eller 6-0.

For at undgå suturmærker fjernes suturerne fra ansigtet og halsen efter 4-6 dage, mens resten af kroppen fjernes disse efter 10-12 dage, dog længere ved beniskæmi, f.eks. efter karkirurgi eller amputation.

Fri hudtransplantation:

Større fladeformede sår kan lukkes ved hjælp af fri hudtransplantation. Der skelnes imellem:

- Tynde (0,2-0,3 mm)
- Mellemstykke (0,3-0,5 mm)
- Fuldhudtransplantater

Et fuldhudstransplantat indeholder epidermis og dermis i hele sin udstrækning. Risiko for skrumpning ved de tynde transplantater er stor i forhold til de tykke transplantater, men til gengæld er sårheling er sikker ved de tynde transplantater end de tykke.

Sårbunden skal være velvaskulariseret uden fibrin, nekroser eller andet avitalt væv, for at transplantatet kan gro fast. Dermis, subcutis, muskelfascie, muskeltvæv og periost udgør en ideel sårbund pga. mikrocirkulation. Knogler uden periost, brusk, kar og nerver kan ikke bruges som sårbund – der må først skabes dække med f.eks. muskel. Der skal være tæt kontakt med sårets mikrocirkulation. Grundig hæmostase i recipientområdet er derfor en absolut nødvendighed.

Der er kun mindre områder, der kan forsøges med et fuldhudstransplantat.

Stilkede lapper:

Ved en stilkede lap forstås en udpræpareret vævsblok, der i modsætning til det frie hudtransplantat har bevaret blodforsyningen gennem lappens vævsstilk.

Blodforsyningen kan være diffus (vilkårlig lap) eller med identificerede til- og fraførende blodkar (aksiallap). Frie lapper har veldefinerede kar og muliggør flytning af relativt store vævsblokke.

Lapperne er velegnede til at dække områder med ringe vaskularisering i sårbunden som f.eks. knogle, sene eller ledhule. De giver også bedre resultater i ansigtet end frie hudtransplantater.

Mikrokirurgi:

Ved mikrokirurgi forstås et kirurgisk indgreb, der kræver optisk forstørrelse og således foregår enten under operationsmikroskop eller med lupbriller. Teknikken muliggør udpræparation af og fri flytning af vævsblokke med karforsyning, der er mindre end 3-4 mm i diameter. I øvrigt er teknikken også velegnet til kirurgiske indgreb på perifere nerver, lymfekar, tuba uterinae, vasa deferentes, tumores i CNS osv.

Sår:

Et sår defineres som et epidermisbrud med heraf eksponering af underliggende væv. Det er opdelt i to:

- Vulnera – en ydre påvirkning f.eks. brandsår, snitsår osv.
- Ulcera – led i en sygdomsproces, hvor indre faktorer fører til en nekrose f.eks. skinnebenssår

Umiddelbart efter læsions opståen kontraherer blodkarrene sig, så blødningens reduceres og såret dækkes af et koagel. Herefter følger en kortvarig reaktiv kardilatation, således at feltet bliver genstand for ødemdannelse med reduceret gennemblødning til følge.

Et sår kan opdeles i 3 faser:

- Den ekssudative fase – organismen forsøger at rense såret og fjerne avitalt væv ved hjælp af immunforsvaret (leukocytter frigør proteolytiske enzymer). Fasen kaldes også den katabole fase.
- Den proliferative fase – tilkomsten af granulationsvæv. Angiogenese og fibroblastproliferation præger denne fase, helingen. Fasen kaldes også den anabole fase.
- Den reparative fase – her modnes fibroblasterne og kollagene fibriller dannes. Keratinocytter vokser hen over granulationsvævet overflade med henblik på at lukke defekten. Myofibriller i såret begynder at trække sig sammen, hvorfor man kan se en skrumpning.

Såret lukkes, hvis det er:

- Rent sår – f.eks. opstået under aseptiske forhold. Det lukkes direkte efter der er sikret hæmostase
- Bakterielt kontamineret sår < 8 timer – renses med vand og sæbe i 10 minutter og fremmedlegemer som jord, asfalt, glassplinter osv. fjernes, hvorefter det lukkes
- Potentielt inficeret sår > 8 timer – en grundig rensning, hvorefter lades ulukket i 4-5 dage med henblik på daglig bindingskift i den ekssudative fase. Ved begyndende granulationsvævsdannelse lukkes såret på ca. 5. dag

Sårinfektion:

Klinisk inficeret sår er kendetegnede ved hævelse, rødme, varme, sekretion og smerte. Luftudvikling i et sår eller i dets omgivelser (føles som sneboldknitren) vækker mistanke om gasudviklende infektion af specielle anaerobe bakterier f.eks. clostridium perfringens, gasgangræn.

Behandlingen består af åbning af alle hulrum og grundig rengøring med fjernelse af avitalt væv samt suturer og etablering af frit afløb for pus, blod- og lymfeansamlinger. Der gives antibiotika, når mikrobiologisk svar foreligger. Når granulationsvævet begynder at vise sig efter passende sårbehandling, lukkes såret med f.eks. fri hudtransplantation.

Ved luftudvikling og nekrotiserende fasciitis laves brede spaltninger og massive vævsexcisioner og der udføres hyperbar oxygenbehandling. Der gives ligeledes antibiotisk behandling efter resistensbestemmelse.

Brandsår (ambustio):

Brandsår opstår, når varme flydende (skoldninger 20 %), faste (kontakt 20 %) eller luftformige stoffer (ild) i kortere eller længere tid påvirker huden. Der medregnes også elektriske skader (ambustio electrica 2 %), ætsninger (corrosio 8 %), lokale forfrysninger (congelatio < 1 %), mere udbredte tilfælde af nekrotiserende fasciitis eller mere udbredte tilfælde af toksisk epidermal nekrolyse (25-30 tilfælde/år).

Incidensen er 12.000 tilfælde/år, hvor 1500 patienter indlægges, og de 200 værst tilskadekomne overflyttes til landets specialafdeling beliggende på Rigshospitalet i København.

Sværhedsgraden af termiske skader afhænger af påvirkningens varighed og agens' temperatur. Dybden angives som grad 1-3:

- Grad 1 – den mest overfladiske læsion med rødme af huden. Særdeles smertende og analgetikakrævende. Huden er intakt.
- Grad 2 – opdeles i overfladisk og dyb. De begge er præget af bullae (væskeansamlinger), rødglimsede fugtig såroverflade med bevaret kapillærrespons og følesans. Forskellen er at overfladisk grad 2 heler på 14 dage, hvorimod dyb grad 2 ikke kan hele og derfor altid skal opereres.
- Grad 3 – total destruktion af alle hudens epitheliale elementer. Fremtræder som bleg, brun eller sort uelastisk hud uden kapillærrespons eller følesans. Der ses ofte koagulerede vener igennem den forbrændte hud.

Brandsårsudbredningen angives i % af den samlede hudoverflade beregnet efter 9 %-reglen. Hoved og hals 9 %, en arm 9 %, truncus forside 18 %, truncus bagside 18 % og et ben 18 %. Håndflade er på ca. 1 %. Kun 2 og 3 grad medregnes i procenttal af forbrændt areal. Procenttallet bruges til at visualisere omfanget af skade og som vejledning mht. behandlingsbehov. Ved et samlede areal > 10 % ses universelt ødem.

Ved omfattende brandsår ses store væske- og elektrolyttab med risiko for udvikling af shock. Arealberegningen kan benyttes til at vurdere behovet for anti-shockbehandling på brandsårscener samt væskebehovet (4 ml x arealprocenttal x kg)

Primærbehandlingen er skylning så hurtigt som muligt med koldt vand indtil smertefrihed, ofte en time. Behandlingen er smertedæmpende og den bremser den inflammatoriske reaktion og nedsætter metabolismen i de varmpåvirkede keratinocytter. Så længe såret er smertefuldt uden skylning, foregår der en inflammatorisk proces i såret.

Et brandsår skal vaskes med vand og sæbe i 5-10 minutter, derefter et lag jelonet (vaselinegaze), herpå rigeligt tørt sugende gaze og efterfølgende fikserende forbindelse. Denne forbindelse aftages efter 10-14 dage, og er såret helet, er behandlingen afsluttet, mens patienten med uophelede områder videregendes til kirurgisk behandling. På ansigtet er ingen indpakning, her gælder ekspositionsbehandling.

Elektriske forbrændinger:

Skadevirkningen af elektrisk strøm er direkte proportional med strømmens spænding og det pågældende vævs modstand.

Skadevirkningen inddeles i:

- Højvoltage-skader > 1000 volt
- Lavvoltage-skader < 1000 volt

Vekselstrøm er farligere end jævnstrøm.

Strømmen ledes i kroppen i det væv, der har den laveste modstand såsom nerver, muskler og blodkar. I disse væv afsættes stor varme, der destruerer vævet. På grund af akut henfald af muskelvæv strømmer frit myoglobin til blodbanen og udfældes i nyretubuli resulterende i shocknyre.

Elektriske skader er vanskelige at vurdere, idet kun mindre kutane skader dækker over større dybereliggende nekroser.

Behandling er:

- Dropanlæggelse Ringer laktat med henblik på forceret diurese (ved rødfarvning af urinen)
- Blærekateter
- Fasciotomi ved ødem i musklerne

Tryksår (decubitus):

Ved længerevarende tryk mod væv opstår iskæmi, som er en smertefuld tilstand. Hvis iskæmien får lov til at fortsætte, kan det lede til vævsdød. Hud kan modstå iskæmi i længere tid end f.eks. muskelvæv, hvorfor tryksåret først viser sig i hudniveau flere dage efter at underliggende muskel er nekrotiseret.

Primær behandling af alle typer af tryksår såvel som profylakse imod tryksår er aflastning. Det opnås ved hjælp af trykaflastende materialer som vandmadras, luftpudesenge, venderegimer, fjernelse af bandager osv.

.....